



手机也能上知网

上手机知网, 随时随地畅游知识海洋! 请手机访问: wap.cnki.net

全科医学手机报

手机订阅 最新医疗情报



发布 人才招聘广告投放

高层次人才荟萃 分学科精准投放 010-82895056转8323

节点文献

老年痴呆患者营养不良的危险因素及护理策略

Nursing measurement and risk factors associated to malnutrition in inpatients with senile dementia

推荐 [CAJ](#) 下载 PDF 下载 不支持迅雷等下载工具, 请取消加速工具后下载。



中国老年保健医学, Chinese Journal of Geriatric Care, 编辑部邮箱, 2010年05期 [给本刊投稿]

【作者】张桂丽; 熊燕; 邝军; 何平先;

【Author】(ZHANG Guilil,2,XIONG Yan1,2,KUANG Jun2,HE Pingxian.3.1 Medcal College of Wuhan University,Wuhan 430062,China;2 Department of respiratory,The people's hospital,Yunyang Medical College,Shiyan 442000,China;3 Institute of nursing of Yunyang medical college,Shiyan 442000,China.)

【机构】武汉大学医学院; 湖北医药学院附属人民医院呼吸科; 湖北医药学院护理学院;

【摘要】目的调查老年痴呆营养不良的危险因素,调整护理策略。方法回顾性调查近8年来收治的痴呆患者,以简易营养评价法评估营养不良,同时筛选出营养不良的危险因素。**结果**老年痴呆营养不良患病率为**63.5%**,褥疮、尿路感染、大小便失禁、低胆固醇及低蛋白血症为老年性痴呆营养不良的危险因素。结论褥疮、尿路感染、大小便失禁、低胆固醇及低蛋白血症可能是老年性痴呆营养不良的危险因素,正确的认知和及时的护理可能会在老年性痴呆**营养不良的预防中起到重要作用**。

【Abstract】Objective to investigate the risk factors associated to malnutrition in inpatients with senile dementia f or supplying clinical evidences for nursing and prevention.Methods A retrospective trial of inpatients with senile dementia was undertaken by mininutritional assessment scale in order to screen risk factors.Results The prevalent of malnutrition in inpatients with senile dementia was 63.5%,and bedsore,infection of urine tract,encopresis,incontinence of urine,low cholesterol and protein may be ... [更多](#)

【关键词】老年性痴呆; 营养不良;

【Key words】Senile dementia; Malnutrition;

【分类号】R473.74 【被引频次】1 【下载频次】61

节点文献中:

[知网节下载](#)

本文链接的文献网络图示:

※本文的引文网络



【参考文献】说明 反映本文研究工作的背景和依据

□□

外文题录数据库 共找到 4 条

